

JO

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 29-6-67 666384

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG

ABONNEMENT ANNUEL

Tél. 34-14-63 - Poste 93

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES) MEUSE

25 F.

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire
67 STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

22 juin 1967

Supplément n°2 au bulletin du mois de juin 1967.

Avertissement

V I G N E

MILDIOU

La situation sanitaire vis-à-vis du Mildiou est à ce jour satisfaisante.

Toutefois, les pluies orageuses, parfois très abondantes, qui se sont produites les 18 et 19 juin dans la plupart des régions, ont provoqué de nouvelles contaminations primaires et des taches apparaîtront normalement d'ici quelques jours.

En conséquence et compte tenu de la nécessité d'assurer une parfaite protection de la vigne en cette phase de grande sensibilité, il convient d'exécuter un nouveau traitement fongicide dans la période du 23 au 27 juin.

L'emploi des produits cupriques est à éviter pendant la floraison.

Information

OIDIUM (rappel)

Il est recommandé de profiter de la floraison pour effectuer un soufrage soigné. On opérera par beau temps.

Avertissement

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER (Rappel de la note du 7 juin).

- Dans les vergers insuffisamment protégés au cours de la période favorable aux contaminations primaires, des taches de Tavelure peuvent être observées en particulier sur les variétés sensibles à cette maladie.

371

Compte tenu des conditions actuelles pouvant permettre l'extension des Tavelures (contaminations secondaires), nous rappelons la nécessité de poursuivre les traitements à raison d'une application tous les 10 à 15 jours. On aura soin de renouveler le traitement après une forte pluie.

- L'arrêt des traitements fongicides contre les Tavelures n'est valable que pour les vergers totalement indemnes de cette maladie.

Information

OIDIUM DU POMMIER

Sur les variétés de pommier sensibles à l'Oïdium, il est nécessaire de renouveler la protection. En cas d'utilisation de soufre fluent (forme poudrage) éviter d'opérer lorsque les organes végétatifs sont humidifiés afin de limiter les risques de brûlures.

Cette dernière technique très efficace pour combattre les infections secondaires peut être poursuivie jusqu'à l'arrêt complet de la croissance (mi-juillet).

GRANDES CULTURES

A PROPOS DES CECIDOMYIES DES CEREALES

Nous avons appris que certains céréaliculteurs envisageaient dès cette année d'appliquer des traitements insecticides contre ces ravageurs. Il est bon de rappeler que si le Lindane s'est effectivement montré efficace contre les insectes au cours de l'expérimentation poursuivie en 1966, trop d'inconnues subsistent encore pour qu'on puisse envisager d'appliquer des traitements contre les blés autrement qu'à titre expérimental. Telles sont les conclusions du Service de la Protection des Végétaux.

Cette prudence est d'autant plus justifiée que l'on peut toujours craindre que les résidus de Lindane sur les grains récoltés n'excèdent les tolérances admises par certains pays importateurs de nos céréales.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :

J. BERNARD et C. GACHON.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :

J. HARRANGER.

Imprimerie de la Station de STRASBOURG / Directeur-Gérant : L. BOUYX.